

Médicaments dosés au Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie des HUPNVS

Adresse postale : 46, rue Henri Huchard, 75877 Paris Cedex 18 Tél. : 01.40.25.84 54 Fax : 01.40.25.88.12

Adresse de livraison : 17 rue Pasteur Valéry Radot - **Porte 7** - 75018 PARIS (UNIQUEMENT du lundi au vendredi de 9h à 17h30) (-2)

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE : Revue de contrat.		<input type="checkbox"/> Sachet Noir
Type et nombre de prélèvements reçus : Non-conformité critique <input type="checkbox"/> Echantillon(s) non identifié(s) <input type="checkbox"/> Discordance Echant/Prescription <input type="checkbox"/> Echantillon(s) manquant(s) <input type="checkbox"/> Contenant non adapté <input type="checkbox"/> Echantillon(s) accidenté(s)		Date et heure d'arrivée à l'accueil du site expéditeur - Visa Date et heure d'arrivée à l'accueil du site destinataire - Visa
Tel : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> NC Critique	<input type="checkbox"/> Si Pré-traitement : <input type="checkbox"/> Centrifugation <input type="checkbox"/> Décantation <input type="checkbox"/> Pas de pré-traitement <input type="checkbox"/> Conservation avant envoi <input type="checkbox"/> TA <input type="checkbox"/> 2 à 8°C <input type="checkbox"/> -20°C	



Pres. Abs. Prel. Abs. UHabs Cond. trans Tub + Autres

Feuille 1	Feuille 2	Feuille 3	Feuille 4
Amoxicilline CLAMOXYL® Avibactam ZAVICEFTA® Bédaquiline et métabolite SIRTURO® Céfazoline Céfépime AXEPIM® Céfotaxime CLAFORAN® Céfotaxime ZINNAT® Ciprofloxacine CIFLOX® Clarithromycine ZECLAR® Clindamycine DALACINE® Clofazimine LAMPRENE® Cloxacilline ORBENINE® Cycloserine SEROMYCIN® Daptomycine CUBICIN® Délamanide et métabolite DELTYBA® Ertapénem INVANZ® Ethambutol MYAMBUTOL® Ethionamide TRECATOR® Imipénem TIENAM® Isoniazide RIMIFON® et métabolite Levofloxacine TAVANIC® Linezolid ZYVOXID® Méropénem MERONEM® Moxifloxacine IZILOX® Ofloxacine OFLOCET® Oxacilline BRISTOPEN® Para amino salicylate PAZER® Pipéracilline Pipéracilline/Tazobactam TAZOCILLINE® Prétomanide (PA-824) Pyrazinamide PIRILENE® Rifabutine ANSATIPINE® Rifampicine RIFADINE® Sulfadiazine ADIAZINE® Sulfaméthoxazole/Triméthoprime BACTRIM® Tedizolide SIVEXTRO®	3TC+ABC KIVEXA® 3TC+ABC+DTG TRIUMEQ® Abacavir (ABC) ZIAGEN® Atazanavir (ATV) REYATAZ® AZT + 3TC COMBIVIR® AZT+3TC+ABC TRIZIVIR® Bictégravir (BIC) BIC+FTC+TAF BICTARVY® Cabotégravir (CAB) Darunavir (DRV) PREZISTA® Dolutégravir (DTG) TIVICAY® Doravirine (DOR) PIFELTRO® DOR+3TC+TDF DELSTRIGO® Efavirenz (EFV) SUSTIVA® Elvitégravir/cobicistat (EVG/COBI) Emtricitabine (FTC) EMTRIVA® Enfuvirtide (T20) FUZEON® Etravirine (ETR) INTELENCE® EVG+COBI+TAF+FTC GENVOYA® EVG+COBI+TDF+FTC STRIBILD® FTC + TDF TRUVADA® FTC+TAF+RPV ODEFSEY® FTC+TDF+EFV ATRIPLA® FTC+TDF+RPV EVIPLERA® Lamivudine (3TC) EPIVIR®/ZEFFIX® Lopinavir (LPV) et ritonavir (RTV) KALETRA® Maraviroc (MVC) CELESENTRI® Névirapine (NVP) VIRAMUNE® Raltégravir et métabolite (RAL) ISENTRESS® Rilpivirine (RPV) EDURANT® Ritonavir(RTV) NORVIR® Ténofovir (TDF) VIREAD® Tipranavir (TPV) APTIVUS® Zidovudine et métabolite (AZT) RETROVIR®	Amiodarone® CORDARONE® Apixaban® ELIQUIS® Ciclosporine® Cinétique de MPA Dabigatran® PRADAXA® Évérolimus® CERTICAN® Flecainide® FLECAINE® Hydroxychloroquine® PLAQUENIL® Mycophénolate®(MPA) CELLCEPT® Rivaroxaban® XARELTO® Ropivacaïne® NAROPEINE® Sirolimus® RAPAMUNE® Tacrolimus®	Aciclovir (ACV) ZOVIRAX®/ZELITREX® Amphotéricine B® AMBISOME® Anidulafungine ECALTA® Atovaquone® WELLVONE® Caspofungine® CANCIDAS® Chloroquine® NIVAQUINE® Dapsone® DISULONE® Elbasvir (EBR)/grazoprévir (GZR) ZEPATIER® Fluconazole® TRIFLUCAN® Flucytosine® ANCOTIL® Ganciclovir (GCV) CYMEVAN®/ROVALCYTE® Glécaprévir et Pibrentasvir (GVR-PIB) MAVIRET® Halofantrine® HALFAN® Isavuconazole® CRESEMBA® Itraconazole® et métabolite SPORANOX® Ivermectine STROMECTOL® Letemavir (LMV) Maribavir (MBV) Méfloquine® LARIAM® Métronidazole® FLAGYL® Micafungine MYCAMINE® Ornidazole® TIBERAL® Osetamivir et métabolite (OSEL) TAMIFLU® Posaconazole® NOXAFIL® Praziquantel BILTRICIDE® Praguaniol® PALUDRINE® Pyriméthamine® MALOCIDE® Quinine® QUINIMAX® Ribavirine (RBV) COPEGUS®/REBETOL® SOF + velpatasvir (VEL) EPCLUSA® Sofosbuvir (SOF) SOVALDI® Voriconazole® VFEND® Zanamivir (ZANA) RELENZA®

<p align="center">CONDITIONS DE PRELEVEMENT</p> <p>Dosages dans les autres liquides biologiques : pot stérile sans conservateur Modalités de prélèvement : résiduel (Cmin) dans l'intervalle des 30 min avant IV ou PO pic (Cmax) : Tmax IV : 30 min après la fin de la Perf. au bras opposé Tmax IM, SC : 1h après injection Tmax PO : voir catalogue des examens sur le site APHP http://triweb.bch.aphp.fr/TRIWEB/catlabo/php/accueil_hupnvs.php Perfusion continue : sans contrainte horaire, au bras opposé</p>	<p align="center">FACTURATION</p> <p>- Tableau national de codage de biologie - Référentiel des actes innovants hors nomenclature de biologie et d'anatomo-cytopathologie (RIHN)</p>
<p align="center">CONDITIONS D'ACHEMINEMENT</p> <p>Prélèvement HORS BICHAT Centrifuger (10 min à 4 000 tours) et décanter le plasma et le congeler rapidement (au maximum 8h) Imipénème : Stabilisation du plasma par du MOPS dans les 45 minutes suivant le prélèvement (dilution au 1/2 v/v) Rifampicine : Stabilisation du plasma par l'acide ascorbique 200 mg/L (dilution au 1/2 v/v) dans les 2 heures suivant le prélèvement Antibiotiques : Plasma ou sérum à -20°C (acheminement dans la carboglace si la durée de transport le nécessite)</p>	<p align="center">ZONE DE TAMPON DE RECEPTION</p>